

Περιεχόμενα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ορμονική και νευρική ρύθμιση της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος Φ. ΧΑΡΣΟΥΛΗΣ	9
Τύλος (κάλος): σημασία και αντιμετώπιση στο διαβητικό πόδι ΕΜ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ	17
Διαβητική κετοξέωση Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ	23
Υπερωσμωτικό μη κετοτικό υπεργλυκαιμικό κώμα Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ	31

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Οξείες μεταβολικές διαταραχές του σακχαρώδη διαβήτη Κ. ΒΟΛΙΩΤΗΣ, Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Δ. ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ, Π. ΜΑΡΑΣ, Ε. ΜΑΡΙΝΟΣ, Ι. ΓΚΙΡΤΖΗΣ	36
--	----

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο επιπολασμός της (χρόνιας αισθητικοκινητικής) περιφερικής διαβητικής πολυνευροπάθειας σε ασθενείς του εξωτερικού διαβητολογικού ιατρείου Ν. ΔΗΜΗΤΣΙΚΟΓΛΟΥ, Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Κ. ΓΕΩΡΓΗΕΦΕΝΔΗΣ, Β. ΠΕΤΡΑ, Π. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Κ. ΜΟΣΧΟΥ	69
Μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας με ακαρβόζη σε ασθενείς με τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη. Συγκριτική, τυχαιοποιημένη μελέτη Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Β. ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ, Κ. ΤΖΟΥΝΑΣ, Χ. ΑΒΡΑΑΜ, Χ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ, Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, Η. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Α. ΜΗΛΙΩΝΗΣ	77
Διατροφικές συνήθειες των IDDM ασθενών του κέντρου μας. Σύγκριση με ανάλογα ευρήματα της Eurodiab IDDM complications study Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Μ. ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ, Κ. ΣΟΥΛΗΣ, Χ. ΜΑΝΕΣ, Ε. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Δ. ΣΚΟΥΤΑΣ	83
Ο παράγων von Willebrand (vWF) σε διαβητικούς τύπου 1, στα πλαίσια της Eurodiab IDDM complications study Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Γ. ΣΚΑΡΑΓΚΑΣ, Χ. ΜΑΝΕΣ, Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Σ. ΓΚΟΥΤΚΙΔΟΥ, Κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ	90
Η εξέλιξη της μη εξιδρωματικής γεροντικής εκφύλισης της ωχράς σε ασθενείς με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια υποστρώματος Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Α. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, Α. ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ, Τ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Π. ΤΡΑΙΑΝΙΔΗΣ	95

Contents

INFORMATIVE ARTICLES

- The hormonal and neural control of endocrine pancreatic function**
HARSOULIS F. 9
-
- Callus play a major role in the development of complications within diabetic foot**
ARVANITAKIS EM. 17
-
- Diabetic ketoacidosis**
PAPAZOGLU N. 23
-
- Hyperglycaemic non-ketotic coma**
PAPAZOGLU N. 31
-

ROUND TABLE DISCUSSION

- Acute metabolic complications of diabetes mellitus**
VOLIOU K, KARAGIANNI D, SIMELIDIS D, MARAS P, MARINOS E, GIRTZIS I. 36
-

ORIGINAL ARTICLES

- Prevalence of peripheral diabetic neuropathy in patients attending an outpatient diabetic clinic**
DIMITSIKOGLU N, KONSTANTINIDOU L, GEORGIEFENDIS K, PETRA V,
PAPAICONOMOU P, MOSCHOU K. 69
-
- Acarbose reduces HbA_{1c} and postprandial glucose level in type 2 diabetes mellitus. A randomised study**
PAGALOS EM, PARCHARIDOU B, TZOUNAS K, AVRAAM C, PETRIDIS S, MANOLAKI C,
THEODORIDIS S, GEORGIADIS H, MILIONIS A. 77
-
- Nutritional habits of IDDM patients in our Diabetic Unit. Comparison with Eurodiab complications study findings**
PAPAZOGLU N, GOUTZOURELA A, SOULIS K, MANES CH, PAPADELI E, SKOUTAS D. 83
-
- von Willebrand factor (vWF) in patients with type 1 diabetes mellitus**
PAPAZOGLU N, SKARAGKAS G, MANES CH, KARAGIANNI D, GOUTKIDOU S, ZACHARIOUDAKI K. 90
-
- The non-exudative age-related macular degeneration evolution in patients with background diabetic retinopathy**
TRIANAFILLOU G, GRAMENOS A, SKOUFARAS A, KARAGIANNI T, TRIANIDIS P. 95
-